

40歳をすぎたら大腸がん検診を受けましょう

大腸がんは日本で最も発症者数が多いがんです。死亡者数も肺がんに次いで多く、特に女性は、部位別死亡者数で第1位となっています。

大腸がんは早期発見すればほぼ100%治すことができます。そのために欠かせないのががん検診です。

大腸がんは早期発見すれば治せるがん

大腸がんで便秘や下痢を繰り返す、血便、腹痛、便が細くなるといった症状が現れたときには、すでに進行しており、根治が難しくなる可能性があります。しかし、症状が現れないレベルで大腸がんを発見し適切な治療を受ければ多くの場合、治すことが可能です。

早期発見するには、定期的にがん検診を受けることがとても大切ですが、大腸がん検診の受診率をみると、男性は49.1%、女性は42.8%で、50%に届いていません。大腸がんを含めてがん検診を受けない理由を聞いた調査によると、最も多いのが「受ける時間が長い」で、「健康状態に自信があり、必要性を感じないから」「心配などはいつでも医療機関を受診できるから」と続していました。

大腸がん検診は、40歳をすぎた人であれば、自治体の住民健診や職場の職域健診で受けることができます。「自分には関係ない」と考えずに、年に1回必ず大腸がん検診を受けましょう。また、身近な人にもぜひ受診をすすめましょう。

便潜血検査で陽性と判定されたら必ず精密検査を

大腸がん検診で一般的に行われているのは、便潜血検査と大腸内視鏡検査です。大腸がんになると便の中に血液が混ざることがあります。便潜血検査は便の中に血液が混ざっていないかを調べる検査です。2日分の便を調べ、1日分でも血液の混入が認められた場合は陽性と判定されます。

便潜血検査の結果が陽性となった場合、大腸内視鏡検査で詳しく調べます。ところが、精密検査が必要となつても受けない人が少なくありません。便潜血検査で陽性と判断された人で大腸内視鏡検査を受けなかったグループは、受けたグループよりも大腸がんによる死亡

クスリン
です。

ご意見をお寄せください 読者アンケート

回答方法 ハガキ、QRコード（またはURLからアクセス）いずれかの方法でお一人さま1回限りとさせていただきます。

ハガキ ① Lifeを受け取った薬局の名称と所在地（例：●●薬局 ●●店 ●●市）

② あなたは現在、「黒酢」や「りんご酢」などを飲み物として飲んでいますか？（飲んでいる／飲んでいない）

③ ②の理由を教えてください
④ ②で「飲んでいる」と回答した方へどんな飲み方をしていますか？（A.そのまま B.水で薄める C.炭酸水で割る D.牛乳で割る E.果汁やジュースで割る F.はちみつなどを入れる G.ヨーグルトにかける H.その他）

⑤ 薬局へのご意見・ご要望
⑥ Lifeへのご意見・ご要望
⑦ 郵便番号・住所 ⑧ 氏名 ⑨ 性別 ⑩ 年齢
⑪ 電話番号 ※記入漏れや間違いがあるとプレゼントをお送りできない場合があります。

QRコード QRコードを読み取るか、https://form.run/_LIFE-202402/でアクセスしてご回答ください。ご利用端末が対応していない場合はハガキでご回答ください。

○上記以外の方法でのご応募は受け付けておりません。

△△△あて先（切ってハガキに貼ることができます）

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前5-47-11

クラスAネットワーク Life2月号係

プレゼント
52
名様

アンケートにご協力いただいた方の中から抽選で52名様に下記の商品をプレゼントいたします。



気軽にトレーニングができる ダンベルボール

二の腕周りの引き締めができる、柔らかくて掴みやすいダンベルボール。ファブリック素材で部屋に馴染み、500gというほどよい重さなので、気軽に続けることができます。トレーニングガイド付き。

ダンベルボール ボルレッチ（2個入り）
約500g/個 直径約13cm 3,960円（税込）
ミズノ 0102-320-799

○商品については、上記に問い合わせください。

*プレゼントの当選登録表は発送をもってかえさせていただきます。ご回答いただいた方の個人情報は、(株)クラスAネットワークにて厳重に管理し、プレゼント以外の目的で使用することはありません。お寄せいただいたご意見・ご要望等は、今後の紙面作り（Webサイトを含む）及び薬局サービス向上に活用させていただきます。

*プレゼント商品は薬局で取り扱いのない場合もあります。

率が4~5倍高かったという報告が出ています。

大腸内視鏡検査では、先端にカメラの付いた内視鏡を肛門から大腸に入れ、大腸内の状況を観察します。検査時には麻酔をするので痛みを感じることはあります。内視鏡検査の際に腫瘍やポリープが見つかった場合には、必要に応じて組織を採取したり、切除したりします。

節酒、禁煙、食物繊維の摂取が大腸がんのリスクを低下

便潜血検査で陰性と判定されても、大腸がんが発生しやすくなる40歳以上の人々は毎年受けるようにしてください。便に血が混じる、腹痛がするなど、気になる症状があるときは、次の検査を待たずに速やかに医療機関を受診しましょう。

大腸がんは節酒、禁煙、食物繊維の摂取により発症リスクが下がることがわかっています。逆に、牛・豚などの赤身の肉、ハムやソーセージなどの加工肉は大腸がんのリスクを上げるといわれます。こうした生活習慣にも気をつけましょう。

なお、大腸がん検査や大腸がんについてわからないことがあるときは、薬局の薬剤師に気軽にご相談ください。



イラストレーション：堺直子

特集 みんなで確認 / 花粉症 対策 総まとめ

■40歳をすぎたら
大腸がん検診を
受けましょう…4

ダンベルボールを52名様
にプレゼント…4

花粉症の人も、そうでない人も みんなの花粉症対策

花粉症かもと内心思っている人、花粉症だけど自身の取り組みを見直したい人、家族に花粉症がいる人など、それぞれの立場でできる対策があります。早速今日からみんなで実行！



どんな治療が
あるの？

医療機関で受ける治療には以下の3つがあります。

薬物療法

花粉症治療の中心が薬物療法で、症状を抑えるために飲み薬、点鼻薬、点眼薬が使われます。くしゃみ・鼻水型と鼻づまり型に大きく分けられ、病型と症状の程度に応じて薬が選択されます。

アレルゲン免疫療法

花粉症は体内に入った花粉（アレルゲン）への、過剰な免疫反応です。アレルゲンを含む治療薬を皮下注射したり舌下に投与し、体をアレルゲンに慣らして免疫反応を起こりにくくする治療です。

手術療法

強い鼻づまりを改善したい場合に行われます。鼻の中の下鼻甲介という部分の粘膜をレーザーなどで焼き、空気の通りをよくします。焼いた粘膜は再生するので、効果は長くは続きません。



家族が
花粉症です

花粉を家の中に持ち込まない工夫を

花粉症の最大原因である花粉との接触の機会を減らすことが大事。同居する家族に花粉症の人がいる場合は、家族みんなで協力して、花粉を家の中に持ち込まないようにしましょう。



妊娠中、
花粉症の症状がつらい…

花粉を浴びない基本の対策を

妊娠4ヶ月までは、胎児への悪影響を避けるために薬は使用しないのが基本です。したがって特にこの期間は、中面で紹介している花粉症対策を参考に、花粉を浴びないように心がけましょう。



薬の使用は必ず医師や薬剤師に相談

妊娠5ヶ月以降は、点鼻薬や点眼薬を一定期間使う分には問題ありません。妊娠後期には飲み薬も使えます。いずれにせよ、妊娠中の薬の使用に関しては、医師や薬剤師に必ず相談しましょう。



日本人の2~3人に1人は花粉症です

2019年に行われた全国調査によると、花粉症の人の割合は約43%で、日本人の2~3人に1人が花粉症であることが判明。中でも最も多いのが今の季節に飛散量が増えるスギ花粉症です。



もしかしたら花粉症かも

セルフチェックで確認！

下記の項目に当てはまる数が多いほど花粉症の可能性が高くなります。特に、目の症状があるときは花粉症が強く疑われる所以早めに受診を。



症状を和らげる 薬物療法

眠気が出ない 飲み薬がほとんど

飲み薬の中にはかつて副作用として眠気が起るものがありました。しかし改良が進み、今は眠気が出ない飲み薬がほとんどです。眠気が出たときは我慢せず医師と相談して薬の変更を検討しましょう。



早めに飲み始める のが重要!

薬の効果を得るには、花粉が本格的に飛び始める前から薬を使い始める「初期療法」が有効。花粉症が話題になり始めた頃に2、3日連続して鼻水、くしゃみが出たら、薬を飲み始めて。



点鼻薬は症状が なくても毎日点鼻

医療機関で処方された点鼻薬は、症状の有無にかかわらず、毎日点鼻するのが基本。市販の点鼻薬には症状が出たときに使うタイプがあるので、用法容量を確認してから使いましょう。



外出時の花粉対策

花粉との接触をできるだけ少なくすることで症状を軽減できます。

出かける前に花粉の 飛散量をチェック

前もって花粉の飛散情報をチェックし、花粉が多く飛びそうな日は外出を控えましょう。どうしても外出しなければならない場合は、飛散量が最も多くなる11～15時前後は避けます。



マスクとメガネで 花粉大幅減

マスクをしていない場合に比べ、通常のマスクで約70%、花粉症用マスクだと約80%以上花粉をカット。通常のメガネでも、メガネをしていないときに比べ、目に入る花粉量は半分に減少。

ツルツルした素材の アウターを選ぶ

毛羽立ちが多いウール類は花粉が付着しやすい素材です。コートなどのアウターはナイロンやポリエステルなどのツルツルした素材や、特殊加工を施した花粉付着抑制素材のものを選んで。


花粉症の治療では強く出ている症状に応じて薬物療法が行われます。
※この紙面では、基本的に飲み薬、点鼻薬、点眼薬などの、医療機関で処方してもらおう薬のことをさします。
医師や薬剤師の説明を聞き、正しく使いましょう。市販薬を利用する場合も、薬剤師に相談しましょう。

点眼薬には、症状がなくても 点眼するタイプも

1日2回点眼するタイプは、症状がなくても朝晩定期的に点眼。症状が出たときに使うのは1日4回または6回点眼するタイプ。症状がつらいから多めにさすなど自己判断で回数を変えないで。

合わせて使うと効果的 点眼型洗眼薬

つらい症状が出たときは、市販の点眼型洗眼薬を合わせて使うのがおすすめ。まず点眼型洗眼薬で目に入った花粉を洗い流し、その後5分以上あけてから目薬をさします。



体质改善が期待できる 舌下免疫療法

舌下免疫療法って なに?

花粉症の原因物質であるスギ花粉エキスを少しづつ体内に入れて、徐々に体をスギ花粉に慣れしていくのがアレルゲン免疫療法。その代表がエキス剤を舌の下に入れる舌下免疫療法です。



5～12月治療開始

治療を始める時期は、スギ花粉が飛んでいない5月から12月くらいまで。スギ花粉が飛散している時期はスギ花粉に対して過敏になっているため、副作用が出やすくなるからです。



毎日服用、最低3年以上 継続推奨

1日1回スギ花粉エキス剤を舌の下に入れ、一定時間保持したあと飲み込みます。少量から服用はじめ、その後決められた一定量を最低3年、できれば4～5年継続して服用します。



大多数の人に効果

舌下免疫療法を含むアレルゲン免疫療法では、8割前後の人に有効性が認められています。また、治療開始後初めてのスギ花粉飛散シーズンから、多くの人が効果を実感しています。



子どもも 受けられる?


5歳以上であれば受けられます。5歳以下に関しては、スギ花粉エキス剤を舌の下に一定時間飲み込まずに置いておけるなど、正しく服用できると医師が判断した場合のみ受けられます。



健康脳クイズ

以下の問題を読んでマスにあてはまる文字を入れましょう。A～Eをつなげてできる言葉は?

答えは、4ページにあります▶



- ① 胸がどきどきすること
タテの
の
カギ
- ② えり抜かれていで鋭
いこと
ヨコの
カギ
- ③ 有力者の後援を受け
ていることを「〇〇が
掛かる」という
カギ
- ④ 標語などを書いた横
長の幕
カギ
- ⑤ 陶磁器を焼くかまのこと
カギ
- ⑥ 大学などの卒業者に
与えられる学位
カギ
- ⑦ 神や仏、高僧などすぐれた人物を信じて全面的に頼ること
カギ
- ⑧ パッとしたことを「〇〇が上がりな
い」という
カギ
- ⑨ クリなどの実を包む、とげのある外皮
カギ
- ⑩ 絶滅したと思われていたが山梨県西湖で見つかった
カギ
- ⑪ ラビスマラジのこと
カギ
- ⑫ 花粉症の原因の一つ
カギ

【鬼の居ぬ間に洗濯】…怖い人やうるさい人がいない間に、のびのびとくつろぐこと。鬼がないでなくとも、たまには上手に気分転換を。

ゲンキレシピ vol. 155

鮭のみそヨーグルト漬け

調理時間: 10分 ○エネルギー: 約150kcal

○食塩相当量: 約0.8g

アスタキサンチンで 体調サポート



鮭の色素成分であるアスタキサンチンには、花粉症を引き起こす原因となるヒスタミンの作用を抑える効果があります。みそヨーグルトは、味もマイルドで誰でも食べやすい漬けだれです。冷凍庫で2週間ほど保存できるので、まとめて漬けて冷凍保存しておくと便利です。

材料(2人分)

●生鮭切り身…2枚 ●みそ…大さじ1 ●ヨーグルト…大さじ2

作り方

- 1 ボウルにみそとヨーグルトを入れてよく混ぜ、みそを溶きのばす。
- 2 鮭は軽く水で洗い流して表面の汚れを落とし、キッチンペーパーなどでしっかり水気をふき取る。
- 3 鮭の表面にみそヨーグルトを塗りラップでぴったり包むか、保存用袋に入れて一晩おく(冷凍すれば2週間もつ。使う時は冷蔵庫で半日かけて自然解凍する)。
- 4 焼くときは余分なみそを落とし、フライパンにクッキングシートを敷いて、両面3～4分ずつ焼く。



レシピをYouTube(動画)でご覧いただけます。QRコードを読み取るか、YouTubeで「ヘルシーライフクラブ」を検索。